

SULFATO DE POTASIO (CRISTALIZADO) CNA

Fertilizante Simple

Fertirriego Uso Foliar

Grado : **0-0-43**

Contenido de nutrientes

Potasio soluble en agua 43%

Azufre 19%

Origen: **China**

Grado Equivalente: **0-0-52**

Índice de acidez teórico: **Neutro**

Tensión superficial: **66,4 Dyn/cm**

Contenido Neto: **25 kg**

Recomendaciones de uso en Fertirriego

Cultivo	Kg/100 litros	Momento y Forma de Aplicación
Frutales inicio	50-100	Desde brotación a postcosecha en forma constante en cada riego.
Frutales en producción	100-300	Desde brotación a postcosecha en forma constante en cada riego.
Citrus	100-300	2/3 de dosis en post cuaje y 1/3 en maduración y engorde de fruto.
Viñas en producción	50-150	Desde brotación hasta postcosecha en forma constante.
Papas	100-200	Desde inicio de la formación del tubérculo.
Hortalizas	100-300	2/3 en los primeros 40 días del ciclo, 1/3 durante el resto del ciclo.
Cucurbitáceas	100-200	Desde floración hasta inicio de formación del fruto.
Frutillas	100-300	Desde el final de floración hasta cosecha.

Recomendaciones de uso para Fertirriego

Se debe preparar la solución madre mezclando la dosis recomendada en el 50% del volumen de agua a utilizar en el riego. Luego de mezclado, se agrega agitando el volumen total de agua de riego.

La conductividad eléctrica del agua no debe superar los 2DS/m.

Aplicar el producto con un volumen de 200-400 litros/ha según desarrollo del cultivo.

Recomendaciones de uso Foliar

Cultivo	Kg/100 L	Momento y Forma de Aplicación	
		Primera Aplicación	Segunda aplicación
Trigo-Cebada-Arroz	2 a 3	Inicio a pleno macollaje	Espiga embuchada
Maíz-Sorgo	2 a 4	V6 a V8	Prefloración
Soja-Poroto-Maní	2 a 4	V4 a V6	R1 en adelante
Girasol-Algodón	2 a 3	V4 a V6	Prefloración
Papa	5 a 10	21 días después de plantación	30 días luego de la 1°
Alfalfa-Verdeos	2 a 3	Al cierre del cultivo	15 días luego del corte
Caña de Azúcar	3 a 5	Cultivo con 50 cm de altura	30 días luego de la 1°

Cultivo	Kg/100 L	Momento y Forma de Aplicación
Frutales	0,5-1,0	Aplicar cada 21 días luego de brotación.No aplicar en floración.
Vid 250	0,5-1,0	Primer en pre-floración, 2° en post-floración y 3° en fructificación.
Olivo 300	0,5-1,5	Aplicar cada 21 días luego de brotación.No aplicar en floración.
Cítricos 300	0,5-1,5	Efectuar 3 a 4 aplicaciones cada 21 días en crecimiento vegetativo.
Hortalizas	1,0-1,5	Efectuar 3 a 4 aplicaciones cada 21 días en crecimiento vegetativo.
Tabaco	0,5-1,0	Efectuar 3 aplicaciones cada 21 días luego del trasplante.

Recomendaciones de uso para aplicación foliar

No aplicar en horas de gran insolación o gran temperatura. La Fertilización foliar es complementaria a la fertilización de base.

Utilizar conjuntamente con un tensioactivo no iónico, no polar a una concentración de 0.5-1%. pH óptimo de aplicación: 6,5 a 7. Las dosis recomendadas deben representar entre el 2-4% de la solución. En aplicaciones conjuntas con fitosanitarios, agregar Sulfato de Potasio (Cristalizado) CNA primero. No dejar los envases abiertos, este producto se humedece en contacto con el aire (es higroscópico)

Inscrito en SENASA N° 17.343